

Інструкція щодо застосування
БІФІДУМБАКТЕРИН-БІОЛІК
Дієтична добавка
ТУ У 10.8-01973452-004:2018

*Прочитайте уважно цю інструкцію перед застосуванням.
Якщо виникнуть додаткові питання, проконсультуйтеся з Вашим лікарем або дієтологом.*

Склад: 1 флакон містить – не менше $5 \cdot 10^7$ КУО життєздатних біфідобактерій;
допоміжні речовини: сахароза, желатин харчовий.

Форма випуску: ліофілізована маса для перорального застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: має вигляд кристалічної або пористої маси різних відтінків бежевого або білувато-сіруватого кольору зі специфічним запахом та смаком. Допускається мармуровість забарвлення. При додаванні води утворює непрозору суспензію.

Загальна інформація.

Сприятливий ефект Біфідумбактерин-Біолік визначається наявністю в ньому живих біфідобактерій, які мають антагоністичну активність проти широкого спектру патогенних або умовно-патогенних мікроорганізмів. Високий кількісний рівень біфідофлори та її домінування в мікробіоценозі досягаються при використанні Біфідумбактерин-Біолік, який нормалізує мікрофлору кишечника та діяльність шлунково-кишкового тракту, покращує обмінні процеси, запобігає розвитку затяжних форм кишкових захворювань, сприяє підвищенню неспецифічної резистентності організму.

Рекомендації до застосування.

Біфідумбактерин-Біолік застосовується в якості дієтичної добавки до їжі як джерело культури *Bifidobacterium bifidum* дітям від народження та дорослим:

- при тривалих кишкових дисфункціях невизначеної етіології;
- при кишкових дисфункціях внаслідок дисбактеріозу кишечника, який виник після тривалої антибактеріальної, гормональної, променевої та інших видів терапій;
- для профілактики розладів функцій кишечника;
- при гострих кишкових інфекціях (у комплексному лікуванні гострої дизентерії, сальмонельозу, ешерихіозу, вірусних діарей та ін.);
- при гострих та хронічних запальних захворюваннях товстого та тонкого кишечника (коліти, ентероколіти) з перебігом на фоні порушень мікрофлори з дефіцитом або відсутністю біфідофлори;
- при ранньому переведенні немовлят на штучне годування або годування донорським молоком.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза.

Біфідумбактерин-Біолік застосовують в розчиненому вигляді перорально за 20-30 хвилин до прийняття їжі. Дітям грудного віку Біфідумбактерин-Біолік можна застосовувати безпосередньо перед годуванням. Вміст флакону розчинити кип'яченою водою кімнатної температури.

Діти. При кишкових дисфункціях дітям до 6 місяців – 1 флакон 1 раз на добу, дітям від 6 місяців та старшим – 1 флакон 1-2 рази на добу.

Дорослі. При гострих, хронічних захворюваннях тонкого та товстого кишечника, колітах і ентероколітах – 1 флакон 2-3 рази на добу у комплексі з загальноприйнятими методами лікування.

Тривалість застосування.

При кишкових захворюваннях – 2-3 тижні, а в окремих випадках – до 3-х місяців.

З метою профілактики рекомендується приймати по 1 флакону 1-2 рази на день протягом 1-2 тижнів.

За необхідності курс прийому можна повторити.

Доза та тривалість застосування може бути змінена за рекомендацією лікаря.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту дієтичної добавки.

Попередження.

Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного застосування.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання: зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не зберігати після розчинення. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Пакування: По 5 або 10 флаконів у пачці.

Термін придатності: 1 рік.

Виробник: ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна, 61070, м. Харків, Помірки, www.biolik.com.ua.